ID: 2013-05-6-T-2888

Тезис

Сырова О.В., Алешкина О.Ю., Загоровская Т.М.

Варианты изменчивости положения и форм матки

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Sirova O.V., Aleshkina O.Yu., Zagorovskaya T.M.

Variants of variability, location and shapes of the uterus

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

При ультразвуковом сканировании у 150 девушек изучены варианты положения и формы матки по сигмальным отклонениям ее размерных характеристик. Выявлено, что наиболее распространенным вариантом положения матки в полости малого таза является anteversio-anteflexio (73,3% случаев): ее тело наклонено вперед (anteversio), а угол между ним и шейкой открыт кпереди (anteflexio). У 26,7% обследованных нами девушек зарегистрированы иное положение матки и ориентация угла между телом и шейкой:

- 2,7% – anteversio со смещением тела матки вправо;
- 14,6% – отклонение тела матки кзади (retroversio) и угол между телом и шейкой открыт кзади (retroflexio);
- 2,0% – вертикальное положение тела матки;
- 2,0% – anteversio со слабо выраженным углом между телом и шейкой матки;
- 5,3% – retroversio с недостаточно выраженным углом между телом и шейкой матки.

По сигмальным отклонениям линейных размеров матки (длина, толщина, ширина) выделено девять форм матки. По длине выделены следующие формы матки: длинные – частота встречаемости составила 12,7%; средней длины – 87,6%; короткие – 8,7%. По толщине: тонкие – 16,0%; средней толщины – 69,3%; толстые – 14,7%. По ширине: узкие – 13,3%; средней ширины – 76,0%; широкие – 10,7%.

Таким образом, чаще всего наблюдаются матки средней длины, ширины и толщины, реже – тонкие, толстые, узкие и длинные. У каждой 9-й девушки матка короткая или имеет широкое тело. Полученные данные представляют практический интерес при профилактическом осмотре или клиническом обследовании.

Ключевые слова: форма матки