

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА — ОСНОВНОЙ ПУТЬ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.А. Хайленко, В.А. Агафонов, Р.Ф. Гарькавцева, В.Н. Богатырев,
Р.А. Керимов, Л.Н. Любченко, В.Ю. Кирсанов, Д.В. Чураков
РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; кафедра онкологии ФУВ ГОУ ВПО РГМУ, Москва

Высокая смертность от рака молочной железы (РМЖ) в РФ обусловлена, в первую очередь, большим процентом запущенности заболевания — около 40%. Благодаря внедрению маммографических скрининговых программ и адекватной специальной терапии за последние годы смертность от РМЖ в экономически развитых странах Европы и Северной Америки снизилась на 25—50%. Накопленный опыт свидетельствует о перспективности вторичной профилактики (ранней диагностики) и разработки современных медицинских технологий в РФ. Основные пути вторичной профилактики РМЖ: государственная рентгеномаммографическая скрининговая программа; медико-генетическое кон-

сультирование, включая генодиагностику наследственной предрасположенности к РМЖ с помощью определения мутации генов *BRCA1*, *BRCA2*; формирование групп риска sporadического РМЖ (фиброзно-кистозная болезнь с атипической пролиферацией эпителия); открытие сети маммологических кабинетов, отделений, диспансеров, центров; создание выездных комплексных маммологических групп; современное техническое, кадровое и финансовое обеспечение; пропаганда методов ранней диагностики.

Реализация на практике указанных направлений вторичной профилактики несомненно приведет к снижению смертности от РМЖ в РФ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В 2007 г. предполагается включить журнал «**МАММОЛОГИЯ**» в перечень научных журналов и изданий, определяемый Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

Приглашаем всех читателей, особенно молодых ученых, **активнее** сотрудничать с нашим изданием.