

## ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Н.Д. ШИХНАБИЕВА

*Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала*

**Актуальность.** Важнейшим показателем для оценки развития специализированных служб и качества диагностики служит показатель активной выявляемости, характеризующий степень охвата населения профилактическими осмотрами.

**Цель исследования.** Анализ выявляемости злокачественных новообразований (ЗН) половых органов при профилактических осмотрах у женщин Республики Дагестан (РД) в сравнительном аспекте с субъектами Южно-Федерального округа (ЮФО) за период 1997–2006 гг. (до 2009г. ЮФО объединял 14 субъектов).

**Материал и методы.** В качестве материала исследования использованы данные по выявляемости при профилактических осмотрах из числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗН половых органов у женщин, полученные из сборников официальной статистической отчетности за 1997–2006 гг.

**Результаты.** За анализируемый период показатель выявляемости злокачественных опухолей половой сферы у женщин в РД несколько лучше (10,8 %), чем в среднем по ЮФО (8,6 %), но значительно хуже, чем в среднем по Российской Федерации (РФ) (14,4 %). В республике особенно хорошо обстоит работа по активному выявлению визуальных форм локализации ЗН половых органов. Так, процент выявляемости рака шейки матки составил 20,7%, что превышает показателя по ЮФО (14,9 %), но в то же время уступает таковому по РФ (24,8 %). Лучшие показатели выявляе-

мости онкогинекологических заболеваний чем в РД среди субъектов ЮФО зарегистрированы в Астраханской области (16,1%) и Краснодарском крае (13,7 %); близкие с РД показатели выявляемости имеют следующие субъекты: Северная Осетия (10,2%), Ставропольский край (8,6 %), Ростовская область (8,5%), Карачаево-Черкесская республика (8,3 %). Самый низкий удельный вес ЗН, выявленных при профилактических осмотрах, зафиксирован в Республике Калмыкия – 4,9%, Республике Адыгея – 4,9 %, Кабардино-Балкарской республике – 6,5 % и Волгоградской области – 7,8 %. Однако настораживает тот факт, что выявляемость онкогинекологических заболеваний в РД при активных осмотрах в динамике имеет тенденцию к ухудшению. В частности, показатель выявляемости за анализируемый период уменьшился более чем в 4 раза – с 23,3 % в 1997 г. до 5,5 % в 2006 г. (в ЮФО он снизился в 1,2 раза – с 11,3 % до 9,6%, а в РФ, наоборот, повысился с 13,6 % до 15,2 %). Особенно снизилась выявляемость при профилактических осмотрах при раке яичников – с 18,5 % в 1997 г. до 4,1 % в 2006 г., т.е. в 4,5 раза; при раке тела матки – с 19,2 % до 7,5 %, т.е. в 2,6 раза, и при раке шейки матки – с 32,1 % до 15,2 %, т.е. в 2,1 раза.

**Выводы.** Показатели активного выявления ЗН половых органов у женщин по РД, в том числе и по ЮФО, неадекватны современным возможностям медицины и свидетельствуют о настоятельной необходимости проведения специальных скрининговых программ.