

6. Царегородцев А.Д., Сухоруков В.С. Актуальные проблемы и перспективы развития диагностических технологий в педиатрии. Рос вестн перинатол и педиат 2006; 1: 3—9.
7. Sukhorukov V.S. Energy deficient diathesis as energy metabolism disadaptation in children. Mat. of VIII World Congress of Int. Soc. for Adaptive Medicine. Moscow 2006; 54.
8. Сухоруков В.С. Врожденные дисфункции митохондриальных ферментов и их роль в формировании тканевой гипоксии и связанных с ней патологических состояний. В кн.: Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и медицинские аспекты. Под ред. Л.Д. Лукьяновой, И.Б. Ушакова. М: Истоки 2004; 439—455.
9. Барашичев Ю.И. Перинатальная неврология. М: Триада-Х 2005; 672.
10. Фениichel Дж. М. Педиатрическая неврология: Основы клинической диагностики: Пер. с англ. М: Медицина 2004; 640.

Поступила 20.08.08

Взаимосвязь симптомов депрессии у детей и подростков и избыточной массы тела в зрелом возрасте: обзор литературы

Association between depressive symptoms in childhood and adolescence and overweight in later life: review of the recent literature

E.T. Liem, P.J. Sauer, A.J. Oldehinkel, R.P. Stolk

Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162: 10: 981—988

Цель исследования: показать взаимосвязь депрессивных симптомов у детей и подростков и проблем избыточной массы тела в более старшем возрасте. Для исследования отобраны 513 резюме статей (MEDLINE, EMBASE, научный web-сайт по всем зарегистрированным журналам с 1.01.1997 по 30.05. 2007). Из анализа были исключены все данные, не касающиеся депрессивных симптомов и избыточной массы ($n=460$), относящиеся к взрослым ($n=10$) или включающие в себя все возрастные группы ($n=2$). В общей сложности изучены 32 статьи, включая 21 исследование перекрестным способом и 11 продольным.

Определены критерии, позволяющие судить о наличии взаимосвязи депрессивных симптомов у девочек в возрасте от 8 до 15 лет и развивающихся в дальнейшем проблем избыточной массы тела, включая коэффициент корреляции, равный 0,14, и коэффициент регрессии, равный 0,27. Показано, что депрессивные симптомы в детском и подростковом возрасте имеют взаимосвязь с последующим риском развития избыточной массы.

Заключение: данные результаты демонстрируют положительную связь между депрессивными симптомами в возрасте от 6 до 19 лет и избыточной массой в более позднем возрастном периоде.

Референт А.И. Асманов