



ИНСТРУКЦИЯ (информация для специалиста)  
по медицинскому применению препарата



## КАТЕДЖЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ

**Регистрационный номер**

**Торговое название:** Катеджель с лидокаином

**Международное непатентованное название:**

лидокаина гидрохлорид / хлоргексидина дигидрохлорид

**Лекарственная форма:** гель для местного применения

**Состав:** 100 г содержат:

<i>активные вещества:</i>	лидокаина гидрохлорида	2,00 г
	хлоргексидина дигидрохлорида	0,05 г
<i>вспомогательные вещества:</i>	гидроксизтилцеллюлозы	1,50 г
	глицерина	20,00 г
	воды для инъекций	до 100 г

**Описание:** Бесцветный (или со слабым оттенком жёлтого), прозрачный гель без запаха

**Фармакотерапевтическая группа:**

антисептическое средство + местноанестезирующее средство

**Код АТХ:** G04A

**Фармакологическое действие:** Комбинированный препарат, оказывающий антисептическое и местноанестезирующее действие. Хлоргексидин - противомикробный препарат, действующий на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, дрожжи, дерматофиты. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий - *Treronepa spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas spp.*, *Chlamydia spp.*, *Ureaplasma spp.* Сохраняет активность (хотя несколько сниженную) в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.

Лидокаин - местный анестетик.

Противомикробное действие и адекватная анестезия развиваются через 5-10 мин после применения препарата.

Водорастворимый прозрачный гель обеспечивает четкий оптический обзор и обладает смазывающим эффектом при различных эндоскопических процедурах.

**Показания:** Профилактика инфекции, анестезия при оперативных и диагностических эндоскопических вмешательствах у детей и взрослых в урологии, гинекологии, проктологии, все формы эндоскопии, замена фистульных катетеров, интубация.

Применяется в комплексной терапии при купировании симптомов воспаления (сопровождающихся болевым синдромом) слизистой оболочки мочеиспускательного канала, влагалища, цервикального канала и прямой кишки.

**Противопоказания:** Гиперчувствительность.

*С осторожностью* - Беременность (I триместр).

Применение при лактации возможно, но не рекомендуется, во избежание не желательных осложнений, кормить грудным молоком детей в течение 12 часов после применения препарата.

**Способ применения:** Для медленной инстиляции перед введением инструментов (врачом или специально обученным персоналом) необходимо:

- раскрыть блистер, удаляя бумагу с прозрачного корпуса (по возможности только до перетяжки);

Korrektur  22.02.06



- отломать кончик без значительного усилия (по возможности еще в упаковке). При этом необходимо проследить, чтобы кончик был полностью удален, во избежание повреждения слизистой. Для облегчения введения рекомендуется предварительно выдавить каплю геля;
- инстиляция посредством легкого давления на гофрированный шприц. После опорожнения шприца необходимо держать его в сжатом состоянии до изъятия.
- введение инструментов рекомендуется проводить через 5-10 минут после инстиляции геля.

**Побочные действия:** При повышенной чувствительности возможны аллергические реакции (аллергический дерматит, кожная сыпь, ангионевротический отек), жжение в месте аппликации.

**Передозировка:** Симптомы (при системном действии лидокаина в случаях тяжелых повреждений мочеиспускательного канала): брадикардия, судороги, коллапс. Лечение: при брадикардии - бета-адреностимуляторы, при судорогах - барбитураты или миорелаксанты короткого действия, при коллапсе - эпинефрин или допамин вводится внутривенно.

**Взаимодействие:** Избегать совместного применения с препаратами йода. Ингибиторы МАО усиливают местноанестезирующее действие лидокаина.

Несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза). Совместим с лекарственными средствами, содержащими катионную группу (бензалкония хлорид).

**Особые указания:** Препарат стерилен и предназначен для однократного введения.

В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.

**Формы выпуска:** Гель содержащий 2% лидокаина гидрохлорида и 0,05% хлоргексидина дигидрохлорида, содержится в гофрированных одноразовых шприцах по 12,5г.

Шприц помещается в блистер, блистер вместе с инструкцией по применению упакован в картонную коробку.

Размеры упаковок: 1 x 12,5 г; 5 x 12,5 г; 25 x 12,5 г

**Условия хранения:** Хранить в темном, недоступном для детей месте, при температуре ниже +25°C.

**Срок годности:** 5 лет. Использовать препарат можно только с учетом срока годности, указанного на упаковке.

**Отпуск из аптек:** По рецепту.

**Производитель:** „Фармацевтическая фабрика Монтавит Гез.м.б.Х.“ 6060 Абзам/ Тироль, Австрия. Представительство компании в Москве: 123242, Б.Прдтеченский переулок, дом 7, тел. (495) 107-72-40, 205-10-52



**КАТЕДЖЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ**

02/06-106 134 RUSSLAND-20.02.2006



Korrektur  22.02.06