

# ПЛЮС

## СЕПТИЛИН® ПЛЮС

Краткая информация по медицинскому применению препарата\*

Каждая таблетка содержит:

### Порошки

Коммифора мукул (смесь масла, камеди и смолы)	324,00	■	■		
Шанкх бхасма (зола)	64,00				
Махараснади кват** (многокомпонентная растительная смесь)	128,80				
Тиноспоры сердцелистной стеблей	99,36			■	■
Марены сердцелистной корней	62,56	■		■	■
Эмблики лекарственной плодов	33,12	■	■	■	■
Моринги крылатосеменной листьев	33,12	■	■	■	■
Солодки голой корней	11,04	■	■	■	■

\* В качестве экстракта для приготовления экстракта из сырья растительного сырья используется вода. Соль хлориды (либ): экстракт смей - 51).

\*\* В состав смеси «Махараснади кват» входят: терминалии клубни оксидированные; терминаны Белевара; эмблики лекарственной плоды; финики красной цвет растения; смолы сердцелистной цвет растения; кинданы обыкновенной плоды растения; перья тимьянового дровицы; терпены кокосового ореха; адроты настоящих корень; либери лекарственного корня; перья лесного дровицы стебли; смолы крапивы; берберис розовоцветной корень; тиноспоры сердцелистной стебли; веточки пыльной коры; урсари индийской плоды; индийский спонгиозный плоды; индийский сапорок корень; корень дурной иволы плоды; смолы кассиовой коры; клубни; перья длинного плода; барбарис финиковый плоды; растение коранды полевое; плоды растения; плоды мятликовидного цветка растения; талена индийского цветка растения.



**Фармакологические свойства:** СЕПТИЛИН® ПЛЮС обладает противовоспалительным действием. Входящие в состав препарата действующие активные вещества растений (биофлавоноиды и дубильные вещества) способствуют уменьшению проявлений воспалительного процесса, снижают проницаемость капилляров, проявляют антиэкссудативное действие. Наличие полисахаридов в составе препарата способствует стимуляции фагоцитоза, за счет повышения фагоцитарной активности гранулоцитов и макрофагов, и ускорению хемотаксиса полиморфно-ядерных лейкоцитов в очаге инфекции.

Препарат СЕПТИЛИН® ПЛЮС усиливает гуморальный иммунный ответ, способствует повышению неспецифической резистентности организма. Применение препарата способствует купированию клинических признаков острого воспаления верхних дыхательных путей. Препарат оказывает противовоспалительный эффект одновременно на слизистую оболочку носоглотки, глотки и небных миндалин.

**Показания к применению:** Риносинусит (острый, обострение хронического). Обострение хронического тонзиллофарингита.

**Способ применения и дозы:** Внутрь. По 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-14 дней. В случае неполного купирования симптомов заболевания, лечение может быть продолжено до 4 недель в дозе по 1 таблетке 2 раза в день или по усмотрению врача.

В случае появления нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта доза препарата может быть снижена до 1 таблетки 2 раза в день. В случае если снижение дозы не приводит к купированию симптомов, рекомендуется отмена препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Применение препарата не исключает возможность применения других лекарственных средств, в том числе антибактериальных препаратов.

**Форма выпуска:** 60 таблеток.

**Условия отпуска:** по рецепту.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Reg. № ЛП-001295 Информация предназначена для медицинских и фармацевтических специалистов.

Эксклюзивный дистрибьютор:  
ЗАО «ТрансАлтантис Интернешнл», Россия,  
119590, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1,  
Тел.: (495) 775-3938, факс: (495) 514-1054/67  
www.transatlantic.ru

Производитель:  
«Хималай Драг Ко»,  
Макали, Бангалор, 562 123,  
Индия  
www.himalayahealthcare.com

**Himalaya**  
SINCE 1930



# СЕПТИЛИН®

- Обладает противовоспалительным действием
- Проявляет антиэкссудативное действие
- Способствует стимуляции фагоцитоза
- Ускоряет гуморальный иммунный ответ
- Способствует повышению неспецифической резистентности организма



Внутри. По 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-14 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: