

Фенистил

Капли 20 мл

HALEON



Фенистил **ПЕРВЫЕ* КАПЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИМПТОМАХ
АЛЛЕРГИИ УЖЕ С 1-ГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ¹**

Показания к применению¹

- Аллергические заболевания: крапивница, сенная лихорадка, круглогодичный аллергический ринит, анионевротический отек, пищевая или лекарственная аллергия.
- Кожный зуд различного происхождения: экзема, зудящие дерматозы, в том числе атопический дерматит, корь, краснота, ветряная оспа, укусы насекомых.
- Профилактика аллергических реакций во время проведения гипосенсибилизирующей терапии.

 Антигистаминный эффект начинает проявляться в течение 30 минут после приема¹

 Удобная форма для применения у маленьких детей¹

 Помогают уснуть, если зуд тревожит малыша²

 Капли имеют сладковатый вкус и разрешены к добавлению в детское питание¹



Дети в возрасте от 1 месяца до 12 лет

0,1 мг/кг массы тела (или 2 капли на 1 кг массы тела)¹
Суточную дозу необходимо разделить на 3 приема

Дети старше 12 лет и взрослые

20-40 капель 2-3 раза в день¹
Суточная доза 3-6 мг(60-120 капель)

*Первый из противоаллергических препаратов в форме капель, разрешенный к применению от 1 месяца. ГРЛС, февраль 2023 ОХЛП препарата Фенистил капли ЛП-№(004051)-(РГ-РУ) от 19.12.2023. При использовании у детей до 1 года следует консультироваться с врачом

1. ОХЛП препарата Фенистил капли ЛП-№(004051)-(РГ-РУ) от 19.12.2023. При использовании у детей до 1 года следует консультироваться с врачом

2. Englisch W, Bauer CP. Dimethindene maleate in the treatment of pruritus caused by varicella zoster virus infection in children. Arzneimittelforschung. 1997 Nov;47(11):1233-5.

Фенистил

ГЕЛЬ

1 мес +

HALEON

Фенистил

Фенистил гель – оригинальный антигистаминный препарат на основе диметиндена малеата – для местного лечения кожных проявлений аллергии¹

Показания к применению¹

Кожный зуд различного происхождения (кроме связанного с холестазом)

- зудящие дерматозы,
- экзема,
- крапивница,
- укусы насекомых,
- солнечные ожоги,
- легкие бытовые и производственные ожоги¹

Способ применения

Наносить на пораженный участок кожи 2-4 раза в день¹



Начинает действовать с **первых минут** после нанесения¹



Оказывает **охлаждающий** эффект¹



Уменьшает зуд и раздражение¹



Разрешен детям **от 1 месяца**¹



Негормональное средство



Не содержит спирт и красители



1. Согласно ОХЛП препарата Фенистил Гель ЛП-№(002755)-(РГ-RU) от 13.07.23

Товарный знак принадлежит или используется Группой Компаний Хелен

АО «Хелен Русь», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 помещение 111, комната 9, этаж 6 тел.: 8 (495) 777 98 50.

PM-RU-FENI-24-00003

Материал предназначен для сотрудников системы здравоохранения