

РЕСЛИП®

(ДОКСИЛАМИН)

сон доступен каждому




Повышает
длительность
и качество сна¹



Оставляет
фазы сна
без изменений¹



Сокращает
время
засыпания^{1,2}



Улучшает качество
пробуждения²



Разрешен
при беременности^{1*}

*при приеме на поздних сроках беременности следует принимать во внимание атропиноподобное и седативное действие доксиламина при наблюдении за состоянием новорожденного

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Реслип® ЛП - №(000580)-(ПГ-РУ) от 16.02.2022

2. Шакирова Н.И. Доксиламин как перспективное средство лечения инсомнии в пожилом и старческом возрасте.

Consilium Medicum // Справочник поликлинического врача - 2007 т.5, №3

N-M-RES-2023_09-111116

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата Реслип®



Торговое название: Реслип®.

МНН: доксиламин.

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав: 1 таблетка содержит: действующее вещество: доксиламины сукцинат 15 мг; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 50,0 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) 0,5 мг, целлюлоза микрокристаллическая 27,7 мг, натрия кроскармеллоза 5,0 мг, повидон 0,8 мг, магния стеарат 1,0 мг; вспомогательные вещества для оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 1,8 мг, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000) 0,6 мг, титана диоксид 0,6 мг.

Показания к применению: Преходящие нарушения сна.

Противопоказания: повышенная чувствительность к доксиламину и другим компонентам препарата, или к другим антигистаминным средствам; закрытоугольная глаукома или семейный анамнез закрытоугольной глаукомы; заболевания уретры и предстательной железы, сопровождающиеся нарушением оттока мочи; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский и подростковый возраст до 15 лет.

Способ применения и дозы: Внутрь. По ½ – 1 таблетке в день, запивая небольшим количеством жидкости, за 15-30 мин до сна. Продолжительность лечения от 2 до 5 дней; если бессонница сохраняется, необходимо обратиться к врачу

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентам со случаями апноэ в анамнезе – в связи с тем, что доксиламин может усугублять синдром ночного апноэ (внезапная остановка дыхания во сне). Пациентам старше 65 лет – в связи с возможными головокружениями и замедленными реакциями с опасностью падений (напр., при ночных пробуждениях после приема снотворных), а также в связи с возможным увеличением периода полувыведения. Пациентам с почечной и печеночной недостаточностью *период полувыведения может увеличиваться).

Побочное действие: Со стороны желудочно-кишечного тракта: запор, сухость во рту. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущения сердцебиения. Со стороны органа зрения: нарушения зрения и аккомодации, нечеткое зрение. Со стороны нервной системы: сонливость в дневное время (в этом случае доза препарата должна быть уменьшена), спутанность сознания, галлюцинации. Со стороны почек и мочевыводящих путей: задержка мочи. Со стороны лабораторных показателей: увеличение уровня креатин-фосфокиназы. Со стороны опорно-двигательного аппарата: рабдомиолиз.

Производитель: АО «Алиум», Российская Федерация.

Организация, принимающая претензии: АО «Алиум», Россия, Московская обл., г.о. Серпухов, рп. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2

Условия отпуска: По рецепту.

Полную информацию по препарату, включая способ применения и дозы, взаимодействие с другими препаратами, полный перечень НЯ, особые указания читайте в инструкции по применению лекарственного препарата Реслип® для медицинского применения; дата пересмотра инструкции: 16 февраля 2022.

Регистрационный номер:

ЛП-№(000580)-(РГ-RU)-160222