

Тизин®

АЛЕРДЖИ



ЛЕЧЕНИЕ аллергического насморка

для взрослых
и детей с 6 лет

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ВРАЧАМ, НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

ОСОБЕННОСТИ препарата

ГОТОВ К НАЧАЛУ
ДЕЙСТВИЯ
уже через

5
МИНУТ*

способен сохранять
АКТИВНОСТЬ

до

12

ЧАСОВ*

НЕ
СОДЕРЖИТ
деконгестант*

НЕ
ВЫЗЫВАЕТ
привыкания*

Рекомендован
на 3-х ступенях терапии АР³

Применение
в течение
ВСЕГО СЕЗОНА
аллергии²



2. Тизин® Аллерджи может применяться до исчезновения симптомов, без ограничений во времени

3. Аллергический ринит, согласно классификации РААКИ 2018.

*Инструкция по медицинскому применению Тизин® Аллерджи.

ТИЗИН® Алерджи

рекомендован
на 3-х ступенях терапии АР³

Тизин®

АЛЕРДЖИ

3. АР – аллергический ринит. Согласно классификации РААКИ 2018.

01

ОДИН ИЗ:

Интраназальные АГ

- нсН1-АГ
- интраназальные кромоны
- АЛР

02

ОДИН ИЗ:

Интраназальные АГ

- ИНГКС (предпочтительно)
- нсН1-АГ
- АЛР

03

КОМБИНАЦИЯ ИНГКС С ОДНИМ ИЛИ БОЛЕЕ ИЗ:

Интраназальные АГ

- нсН1-АГ
- АЛР



СРАВНЕНИЕ МЕСТНЫХ И СИСТЕМНЫХ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ¹

% пациентов, почувствовавших облегчение,
спустя час после приема

38%
группа
ЦЕТИРИЗИНА



76%
группа
ЛЕВОКАБАСТИНА

1. Дроун М.А., Янг В.Н., Более быстрое начало действия при местном применении левокабастина, чем при приеме перорального цетиризина. Медиаторы воспаления. 1995; 4(7): S5-S10.