

ОДИН ЗАБОЛЕЛ – ВСЕМ КАГОЦЕЛ®



УЖЕ С ПЕРВОГО ДНЯ

НАЧИНАЕТ СНИЖАТЬ ВЫРАЖЕННОСТЬ
СИМПТОМОВ ОРВИ ¹



ПОМОГАЕТ

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ ²



ДАЖЕ ПРИ ЗАПОЗДАЛОМ

НАЧАЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ^{3*}




1. Макасова В. Применение препарата Кагоцел® для лечения и профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Медлайн Экспресс–2009–№1 (201)–С. 42–46.
2. Фазылов В. Х., Ситников И. Г., Силина Е. В., Шевченко С. Б., Можина Л. Н., Замятина Л. Л. и др. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (результаты многоцентрового международного наблюдательного исследования FLU-EE). Терапевтический архив. 2016;88(11):61–68. 3. Общая характеристика лекарственного препарата Кагоцел®, РУ ЛП-Н(002233)-(РГ-РУ) от 30.01.2024 г. *Для достижения лечебного эффекта прием препарата следует начинать не позднее четвертого дня от начала заболевания. № М-М-KGC(T)-2024_10-759

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.



Клиническая эффективность КАГОЦЕЛ®

в терапии гриппа и ОРВИ у детей с 3 лет^{1,8}



КАГОЦЕЛ® – индуктор интерферонов – универсальный препарат для противовирусной терапии гриппа и ОРВИ¹⁻⁷



УЖЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ПРИЕМА
начинает снижать выраженность
симптомов ОРВИ²



ДАЖЕ ПРИ ЗАПОЗДАЛОМ
начале лечения⁹





ПОМОГАЕТ
предупреждать осложнения³




ОБЛАДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫМ
профилем безопасности¹⁻³

Схемы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ¹

Лечение:



Профилактика¹⁰:



⁹Для достижения лечебного эффекта прием препарата следует начинать не позднее четвертого дня от начала заболевания

¹⁰ Профилактика гриппа и ОРВИ проводится 7-дневными циклами. Длительность приема от одной недели до нескольких месяцев.


1. Общая характеристика лекарственного препарата Кагоцел®, РУ ЛП- N(002233)-(P)-RU от 30.01.2024 г. 2. Максаква В. Применение препарата Кагоцел® для лечения и профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Медлайн Экспресс-2009-№1 (201) -С. 42-46. 3. Фазылов В. Х., Ситников И. Г., Силина Е. В., Шевченко С. Б., Можина Л. Н., Занятина Л. Л. и др. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (результаты многоцентрового международного наблюдательного исследования FLU-EE). Терапевтический архив. 2016;88(11):61-68. 4. Сологуб Т.В., Цветков В.В. Кагоцел в терапии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: анализ и систематизация данных по результатам доклинических и клинических исследований // Терапевтический архив.-2017.-Т. 89, №8.-С. 113-119. 5. Савенкова М.С. И соавт. Анализ сравнительного лечения ОРВИ в эпидсезоны 2016-2016гг на основе результатов мультиплексной ПЦР-диагностики в условиях амбулаторной практики. «Фарматека» - №1 - 2017. с-38-45. 6. Силина Е.В., Ситников И.Г., Фазылов В.Х., Егания Г.А. Лечение острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у пациентов с артериальной гипертензией. Терапевтический архив. 2019;9:53-61. 7. Ситников И.Г., Фазылов В.Х., Силина Е.В. Лечение гриппа и других ОРВИ у больных сахарным диабетом // Терапевтический архив. - 2019;10:4-12. 8. Елкина Н.Т., Пирожкова Н.И. и др. Комплексная терапия острых респираторных заболеваний у детей дошкольного возраста на педиатрическом участке // Лечащий врач. - 2014. - № 2. - С. 86-89. № М-М-KGC(П)-2024_09-737

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.



Клиническая эффективность КАГОЦЕЛ®

в терапии гриппа и ОРВИ³



КАГОЦЕЛ® – индуктор интерферонов – универсальный препарат для противовирусной терапии гриппа и ОРВИ¹⁻⁴



УЖЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ПРИЕМА
начинает снижать выраженность
симптомов ОРВИ²



ДАЖЕ ПРИ ЗАПОЗДАЛОМ
начале лечения[°]




ПОМОГАЕТ
предупреждать осложнения³



ОБЛАДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫМ
профилем безопасности¹⁻³

Схемы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ¹ для взрослых:



[°]Для достижения лечебного эффекта прием препарата следует начинать не позднее четвертого дня от начала заболевания.

^{°°}Профилактика гриппа и ОРВИ проводится 7-дневными циклами. Длительность приема от одной недели до нескольких месяцев.

1. Общая характеристика лекарственного препарата Кагоцел®, РУ ЛП- N(002233)-(P)-RU от 30.01.2024 г. 2. Макасова В. Применение препарата Кагоцел® для лечения и профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Медлайн Экспресс-2009-№1 (201)-С. 42-46. 3. Фазылов В. Х., Ситников И. Г., Силина Е. В., Шевченко С. Б., Можина Л. Н., Замятina Л. Л. и др. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (результаты многоцентрового международного наблюдательного исследования FLU-EE). Терапевтический архив. 2016;88(11):61-68. 4. Сологуб Т.В., Цветков В.В. Кагоцел в терапии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: анализ и систематизация данных по результатам доклинических и клинических исследований // Терапевтический архив. -2017.-Т. 89, №8.-С. 113-119. № М-М-KGC(T)-2024_10-759

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.



КАГОЦЕЛ® - универсальный препарат для лечения гриппа и ОРВИ

Можно применять
даже при запоздалом
начале лечения^{2,6}



Эффективен
независимо от типа
респираторного вируса^{1,2}



При комплексном
применении с другими
лекарственными препаратами
для лечения ОРВИ⁵



Независимо
от возраста³
и сопутствующих
заболеваний пациента^{2,3,4}



	кагоцел ¹	Имидазолилэтанамид пентадиновой кислоты ⁶	Унифеновир ⁷	Оксизитиламмония метилфеноксиацетат ⁸	Антитела к гамма интерферону, гистамину, CD4 ⁹
Механизм действия	• Индуктор поздних интерферонов¹ • Стимулирует синтез эндогенного ИФН, поскольку вирус угнетает его выработку • Способствует активации на борьбу с вирусами^{3,4,5} собственные силы организма.	• Повышает экспрессию рецептора ИФН на поверхности клеток • Действует только на вирусы гриппа А и В, аденовирусы, парагриппа, РС-вируса, риновируса⁶	• Ингибитор фузии, препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран • Специфически подавляет in vitro вирусы гриппа А и В, ОРВИ, SARS-CoV-2⁷	• Адаптогенный препарат, стимулирует выработку альфа, гамма-интерферонов • Точный механизм действия не установлен⁸	• Повышение функциональной активности CD4-рецептора, рецепторов к ИФН гамма и гистамину • Ни один метод анализа не позволяет определить действующее вещество в организме⁹
Длительность лечения гриппа и ОРВИ	✓ 4 дня	5-7 дней	5 суток	8 дней	До полного выздоровления
Снижение выраженности симптомов	✓ с 1 дня приема ⁵	2-3 сутки от начала курса лечения ⁶	2-3 сутки от начала курса лечения ⁷	3-5 сутки от начала курса лечения ¹¹	2 сутки от начала курса лечения ¹³
Возможность старта терапии	✓ 1-4 день болезни ¹	1-2 день болезни ⁶	1-3 день болезни ⁷	Не указано в инструкции ⁸	1-2 день болезни ⁹
Возможность приема препарата с другими ЛС	✓ Без ограничений ¹	Не рекомендовано ⁶	Не описано ⁷	Не описано ⁸	Не описано ⁹

¹Для взрослых и детей с 3 лет.

^{3,4,5}ИФН – индукторы интерферонов.

^{3,4,5}Вирусы гриппа А и В, парагриппа, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, коронавирусы, аденовирусы.

1. Общая характеристика лекарственного препарата Кагоцел®. РУ ЛП- N(002233)-(PI-RU) от 30.01.2024 г. 1. 2. Савенкова М.С. Анализ сравнительного лечения ОРВИ в эпидсезоны 2015-2016 гг. на основе результатов мультиплексной ПЦР-диагностики в условиях амбулаторной практики // Фарматека. – 2017. – № 1. – С. 38–45. 3. Малеев В.В., Селькова Е.П., Простиков И.В., Осипова Е.А. Фармакоэпидемиологическое исследование течения гриппа и других ОРВИ в сезоне 2010-11 гг. // Инфекционные болезни. – 2012. – №3 (10). – С. 15-23. 4. Костиков М.П. Лечение острой респираторной инфекции у взрослых: результаты многоцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования // Лечащий врач. – 2019. – № 10. 5. Макасова В.Л. Применение препарата Кагоцел® для лечения и профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций // Медлайн-Экспресс. – 2009. – № 1 (201). – С. 42-46. 6. Инструкция по медицинскому применению Ингавирина ЛСР-006330/08. 04.04.18. 7. Инструкция по медицинскому применению Арбидол ЛСР-00390/07. 06.10.2022. 8. Инструкция по медицинскому применению препаратов Трекресан, Трекресил, Трекресол ЛСР-008909/09 от 03.06.2022. ЛП-005402 от 21.12.2021. ЛП-005865 от 13.11.2020. 9. Инструкция по медицинскому применению препарата Эргоферон ЛП-№(000031)-(PI-RU) от 25.03.2022. 10. Петров В.А., Родионова Н.В., Назарочкина О.В., Полежаева М.А., Разуваев О.А. Клинико-эпидемиологическая эффективность Кагоцела при профилактике ОРВИ и гриппа в предэпидемический период 2017-2018 года // Лечащий врач. – 2018. – № 6. 11. Малиникова Е.Ю. и др. Результаты наблюдательного исследования эффективности и безопасности препарата Трекресан® у взрослых больных острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) // Терапия. – 2012. – № 8. 12. Ситников И.Г. Влияние сроков начала терапии острой респираторной вирусной инфекции и гриппа на динамику клинических симптомов и исходы заболевания (результаты когортного международного наблюдательного исследования FLU-EE (ФЛЮ-ИИ)) // Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95, № 7. – С. 634-641. 13. Никифоров Владимир Владимирович, Руженцова Татьяна Александровна Клиническая эффективность и безопасность Эргоферона при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях: критическая оценка с позиций доказательной медицины // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. 2019. №4 (31) № М-М-KGC(T)-2024_10-76

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.