

Письмо Минздрава РФ
№ 17-4/И/1-7530 от
20.05.2021

Алгоритм выбора фармакотерапии ожирения
согласно клиническим рекомендациям МЗ РФ

Назначения врача должны максимально соответствовать
данным систематических обзоров, результаты которых
относятся к категории 1А

Клинические рекомендации МЗ РФ
«ОЖИРЕНИЕ»

МНН	Уровень достоверности доказательств УДД	Уровень убедительности рекомендаций УУР
Сибутрамин	1	A
Орлистат	1	A
Лираглутид	2	B
Сибутрамин+Метформин	2	B

УДД	РАСШИФРОВКА
1	Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа
2	Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа
3	Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследование "случай-контроль"
5	Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов

УУР	РАСШИФРОВКА
A	Сильная рекомендация
B	Условная рекомендация
C	Слабая рекомендация

все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными

не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными

отсутствие доказательства наилучшего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются незажимыми, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

