


# Ожирение

главный фактор риска сахарного диабета 2 типа

Может, я просто ленивая?



Может, моя стихия - вода?



Может, что-то в глаза попало?




- ! По данным Росстат в РФ 5,2 млн. пациентов с СД
- ! По данным эпидемиологического исследования в РФ 10-12 млн. больных с СД
- ! Каждый 2-й пациент с СД не диагностирован
- ! Каждый 3-й пациент (30%) имеет ОЖИРЕНИЕ

Дедава И.И. и соавт. Сахарный диабет 2021; 24 (5):204-221. doi:10.14341/DM112759. Росстат, 2022


ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Относительный риск развития СД2 при увеличении массы тела



Maugkos, F. Am. J. Clin. Nutr. 110, 533-539 (2019)

Частота ремиссии СД2 при снижении массы тела (%)



\*Lewin, M.E.J. et al. the DiCERt trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 7, 344-355 (2019)

Мы можем контролировать причину. И она находится на кончике вилки. Томас Эдвард Кэмпбелл

## Ситагликс (ситаглиптин)

Надежный и длительный гипогликемический эффект без набора массы тела<sup>1</sup>



При снижении массы тела на 5-15% возрастает частота РЕМИССИИ сахарного диабета до 80%\*. При неэффективности немедикаментозных методов снижения массы тела рекомендуются:

## Голдлайн Плюс (МНН Сибутрамин + МКЦ)

эффективный препарат для снижения массы тела

- ✓ Минус 12 кг за 6 месяцев терапии<sup>1</sup>
- ✓ ИМТ снижается на 13,6%<sup>2</sup>
- ✓ ОТ снижается на 10,4%<sup>2</sup>
- ✓ Достигнутый результат сохраняется до 2-х лет<sup>3</sup>



## Листата (МНН Орлистат)

эффективный препарат для снижения массы тела

- ✓ оптимальный вариант для коморбидных пациентов с минимальным количеством нежелательных эффектов<sup>4</sup>



Имеем лицензию на производство. Знакомьтесь с инструкцией

1. Mounier P, et al. Efficacy and safety of sitagliptin in the treatment of type 2 diabetes. Diabetes Care 2011; 34:1111-1117.  
2. Wadden JA, et al. The effect of sibutramine on weight loss and cardiovascular risk factors in obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28:1111-1117.  
3. Lewin M, et al. The effect of orlistat on weight loss and cardiovascular risk factors in obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2011; 34:1111-1117.  
4. Tsigos E, et al. The effect of orlistat on weight loss and cardiovascular risk factors in obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2011; 34:1111-1117.