

Микролакс®
СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ

Анкетирование детей и/или их родителей при визите к участковому педиатру (визит не связан с гастроэнтерологической патологией)¹



2250

детей
1 месяц – 18 лет



55%

Частота хронических
запоров в дошкольном
возрасте



57,4%

Задержка стула
до 3 раз в неделю
и реже²



43%

Иные
симптомы!³

Основные симптомы запора у дошкольников:



длительное пребывание в туалете



затруднение дефекации



изменение характера стула



натуживание

1. Мацукатова Б.О. Клинические особенности, электрическая активность ЖКТ, дифференцированный подход к лечению запоров у детей. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 14.01.08 – Педиатрия. Москва, 2018. 2. Среди детей с запором. 3. Каломазание, боль в области заднего прохода, наличие прожилков в крови, чувство распирания и переполнения или вздутия живота, ощущение неполного опорожнения.

микрoлакc®
СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОР: РИМСКИЕ КРИТЕРИИ IV 2016

Диагностические критерии запора для детей старше 4 лет*

1

2 или более симптома присутствуют 1 раз в неделю как минимум 1 месяц*

- Каловые массы большого диаметра в анамнезе
- Волевое удержание кала
- Большое количество каловых масс в прямой кишке
- В анамнезе – болезненный или твердый стул
- 1 и более эпизодов недержания кала в неделю
- 2 и менее дефекации в неделю

2

Симптомы не могут быть отнесены к другим заболеваниям

3

Недостаточно критериев для СРК

1) Эрдес С.И., Мащукатова Б.О., Антишин А.С. Эпизодические и хронические запоры у детей: пошаговый подход к терапии в рамках IV Римских критериев. Педиатрия. Consilium Medicum, 2019; 1: 71–76. 2) Римские IV рекомендации по диагностике и лечению функциональных гастроэнтерологических расстройств: пособие для врачей / С.И. Пиманов, Н.И. Сливочник. – М.: 2016. – 160 с. с ил. 3) <https://theromefoundation.org>. Запоры у детей. Под ред. Бельмера С. В., Разумовского А. Ю., Хавкина А. И., Файзуллиной Р. Ф. М.: ИД «Медпрактика-М», 2016; с. 90–91. Инструкция по медицинскому применению препарата Микрoлакc®. Микрoлакc® раствор для ректального введения РУ П N011146/01 от 05.05.2010. Основные показания: запор. Действующие вещества: натрия цитрат, натрия лаурилсульфоацетат, раствор сорбитола. Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Побочные действия: 1) нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (очень редко: боль в области живота, дискомфорт в аноректальной области, жидкий стул); 2) нарушения со стороны иммунной системы (очень редко: реакции гиперчувствительности (например, крапивница).

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. Июль 2021. RU-MX-2100065

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ВРАЧЕЙ. НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

